

Niniejsza broszura zawiera aktualne zalecenia ESCCAP dotyczące odrobaczania psów i kotów.

ESCCAP jest niezależnym specjalistycznym stowarzyszeniem parazytologów wspierających właścicieli zwierząt w staraniach na rzecz zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia czworonożnych przyjaciół i ograniczania ryzyka przenoszenia chorób ze zwierząt domowych na człowieka.

**Pamiętajmy: posiadając odpowiednią wiedzę można łatwo i skutecznie zwalczyć pasożyty wewnętrzne u zwierząt.**



Pieczętka lecznicy

Kontakt:  
Pracownia Parazytoz Zwierząt Domowych  
Instytutu Parazytologii PAN  
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa  
tel. 22 697 89 68  
pracowniaparazytoz@tlen.pl

Wydawca:  
Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt  
Towarzyszących - ESCCAP Polska  
przy pomocy sponsorów:



Bayer



[www.esccap.pl](http://www.esccap.pl)

Wydawca: Polska Rada Konsultacyjna  
ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących - ESCCAP Polska

## Jak często należy odrobaczać zwierzęta?

Aktualne zalecenia dotyczące ochrony przed pasożytami



## Jakie zagrożenia czyhają na mojego zwierzaka?

Wszystkie psy i koty – młode i stare, przebywające na zewnątrz i w domu, psy myśliwskie i małe pieski trzymane na kolanach – mogą się zarazić pasożytami wewnętrznymi. Stopień ryzyka zarażenia, a tym samym wymagana częstotliwość przeprowadzania badań w kierunku pasożytów lub zabiegów odrobaczania zależy od wieku zwierzęcia, sposobu jego utrzymania, użytkowania i karmienia.

Szczenięta mogą zarażać się glistą już w życiu płodowym. Kocięta rodzą się wolne od glist natomiast mogą zarazić się w okresie karmienia przez matkę. W późniejszym wieku istnieje niebezpieczeństwo zarażenia psów i kotów za pośrednictwem form inwazyjnych znajdujących się w glebie i w wodzie. Stadia larwalne niektórych pasożytów mogą znajdować się w surowym (niebadanym) mięsie lub w tkankach drobnych zwierząt będących łupem psów i kotów, na przykład myszy, królików, ptaków, czy płazów.

### Przenoszenie pasożytów ze zwierząt na człowieka

Niektóre gatunki robaków (tasiemców i nicieni) mogą się także przenosić na człowieka stając się przyczyną poważnych chorób, takich jak toksokaroza oczna, zespół larwy wędrującej, torbiele bąblowcowe i inne). Poddawanie psów i kotów właściwym zabiegom likwidującym inwazję lub zabezpieczającym przed zarażeniem pasożytami jest także elementem profilaktyki służącej ochronie właścicieli zwierząt.

### Ryzyka związane z pobytem zwierząt za granicą

W czasie pobytu za granicą psy i koty mogą być narażone na dodatkowe ryzyko zarażenia pasożytami. W krajach Południowej Europy istnieje możliwość zarażenia przenoszonym przez komary nicieniem *Dirofilaria immitis*.

## Jak często należy odrobaczać zwierzęta?

Prawdopodobieństwo zarażenia danego zwierzęcia pasożytami wewnętrznymi – a tym samym częstość poddawania go kuracji odrobaczania – ocenia lekarz weterynarii. Swoją ocenę opiera on na informacjach uzyskanych między innymi w odpowiedzi na następujące pytania:

- **Czy zwierzę przebywa na wybiegu, pod kontrolą lub bez?**
- **Czy zwierzę ma kontakt z osobnikami tego samego gatunku lub z innymi zwierzętami?**
- **Czy zwierzę poluje na myszy lub inne zwierzęta?**
- **Czy zwierzę jest karmione surowym mięsem lub podrobami?**
- **Czy zwierzę jest przeznaczone do hodowli, uczestniczy w wystawach i konkursach?**
- **Czy pies wykorzystywany jest w polowaniach jako pies myśliwski lub do innych zadań profesjonalnych, np. jako pies policyjny lub w celach terapeutycznych?**

Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji lekarz weterynarii może właściwie ocenić indywidualny stopień ryzyka zarażenia zwierzęcia pasożytami i określić częstość przeprowadzania odrobaczania. Jednoznaczna ekspertyza możliwa jest jednak tylko w oparciu o wyniki badań kału zwierzęcia.

**Podstawowa zasada:** w przypadku braku możliwości określenia ryzyka zarażenia zwierzęcia pasożytami zalecane jest przeprowadzanie odrobaczania czterokrotnie w ciągu roku. Badania wykazują, że 1- lub 2-krotna kuracja odrobaczania w ciągu roku nie zapewnia zwierzętom wystarczającej ochrony.

**Dobra rada:** przy zakupie psa należy koniecznie sprawdzić w książeczce zdrowia czy zwierzę było odrobaczane od 2 tygodnia życia.

**Profilaktyka na co dzień:** ze względu na to, że źródłem chorób pasożytniczych często są odchody zarażonych zwierząt, każdy właściciel psa, chcąc dbać o zdrowie nie tylko swojego pupila, ale także swojej rodziny i swoje, musi zawsze pamiętać o sprzątaniu po swoim podopiecznym podczas spacerów.

**Ważne!** Świeże odchody nie zawierają jeszcze form inwazyjnych pasożytów, a zatem nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka i zwierzęcia. Niesprzątnięte, z czasem stają się niebezpieczne. Nie należy bać się sprzątania świeżych odchodów!

## Zalecenia specjalne:

- W przypadku psów przebywających na niekontrolowanym wybiegu, psów myśliwskich oraz zjadających dzikie zwierzęta lub padlinę zalecane jest przeprowadzanie zabiegów odrobaczania raz w miesiącu (zapobieganie bąblowicy).
- W szczególnych przypadkach wskazane jest podawanie preparatów przeciwko glistom co 3 - 4 tygodnie (głównie w sytuacji wysokiego ryzyka zarażenia zwierząt i bliskiego kontaktu zwierząt z małymi dziećmi), gdyż dzięki temu można uniknąć wydalania przez psy i koty jaj glist stanowiących zagrożenie dla człowieka.
- Szczenięta w wieku 2 tygodni i kocięta w wieku 5 tygodni koniecznie należy poddać pierwszemu zabiegowi odrobaczania. Zabiegi te należy powtarzać regularnie co 3 tygodnie (szczenięta) i co 5 tygodni (kocięta) przez cały okres karmienia mlekiem matki.
- Karmiące suki i kotki powinny być poddane kuracji odrobaczania równocześnie z pierwszym zabiegiem wykonywanym na ich młodych.
- Nie zaleca się podawania surowego mięsa i podrobów nieznanego pochodzenia tj. niebadanego przez lekarza weterynarii. Sprawy żywienia konsultuj ze swoim lekarzem weterynarii.

### Badania kału

W celu ustalenia, czy psy lub koty są zarażone nicieniami lub tasiemcami niezbędne jest wykonanie badań kału. Ważne jest, aby analiza kału przeprowadzana była systematycznie (analogicznie jak zalecane zabiegi odrobaczania).

W przypadku systematycznych badań kału zabieg odrobaczania przeprowadzany jest tylko w sytuacji stwierdzenia w odchodach członów (tasiemce) lub jaj pasożytów.